

AUTOHEMOTERAPIA



+526622140009

info@centromeicomonobe.com

Ave 3 Num 43 Bugambilias,
Hermosilo Sonora cp 83140

Instrucciones

Una vez entregado el frasco de autohemoterapia preparado seguir las instrucciones a continuación:

Desde su entrega el frasco debe de mantenerse en la puerta del refrigerado a 4 grado centígrados

Todos los días hay que aplicar 1 mililitro con una jeringa para insulina (de 1 mililitro)

Hay que desinfectar con alcohol la tapa antes de insertar la jeringa, importante en no introducir aire al querer obtener la muestra y siempre hacerlo con las manos recién lavadas con agua y jabón.

La muestra se debe de tomar arriba de la flama de la estufa a una distancia prudente para no quemarse, de esta manera evitar que entre aire contaminado a el frasco. Ver imagen a continuación:



PRECAUCIONES:

Si al momento de tomar la muestra cambio de color a mas oscuro suspender aplicación. Si después de algunas horas de haberse realizado la aplicación iniciar con dolor, enrojecimiento y calor en la zona aplicada y no desaparece al día siguiente SUSPENDER APLICACIÓN y acudir a consulta para reevaluación y cambio de frasco, ya que es probable que se haya contaminado.